

Mardi 09/07 07h30 + cigarette

RMN CARDIAQUE DE STRESS

(à l'Adénosine)

rendez-vous au 04 224 85 93

Contre-indications à l'examen

- PCMK prothèses valvulaires mécaniques, clips intra-craniens, pompes à morphine/à insuline, grossesse de plus de 3 mois, claustrophobie et en cas de décubitus impossible
- contre-indication liée à la perfusion d'adénosine (qui agit comme la persantine, vasodilatateur puissant):
 - FE < 20 % (risque de décompensation aiguë en cas d'ischémie surajoutée)
 - Sténose coronarienne connue > 90-95 %
 - Bloc AV susceptible d'évoluer en bloc de haut grade
 - BPCO sévère, asthmatique
 - Patient sous nitrés, théophylline, dipyridamol (persantine), (betabloquant)

A stopper avant le test

- Les aliments pouvant contrecarrer l'effet de l'adénosine: **café, thé, chocolat, bananes, coca à stopper 24 heures avant l'examen**
Mais le patient ne doit pas être à jeun
- Les médicaments susceptibles de contrecarrer l'effet à l'adénosine:
 - **Theophylline:** à stopper 48 heures avant l'examen (euphyllin, pédiaphyllin, théo-2, théo-dur, théolair, théophyllard, xarthium, tévradil)
 - **Nitres et apparentés:** à stopper 48 heures avant (Coruno à stopper 48h avant) (cédocard, corvaton, corvatard, coruno, deponit, diafusor, isordil, minitran, nitroderm, nitrodyl, nitrolingual, nysconitrine, pentacard, promocard, etc.)
 - **Beta-bloquants:** à stopper 48 heures avant (aténolol, bisoprolol, dimitone, emconcor, kredex, nobiten, seloken, selozok, sotalex, ténormin, etc.)
 - **Persantine:** à stopper 48 heures avant (aggreriox, coronair, dipyphar, dipyridamole, dipyridan, docdipyri, persantine)